

NAVODILO PACIENTKI

DOLGI PROTOKOL ALI SPODBUJANJE OVULACIJE S PREDHODNO UPORABO AGONISTOV GnRH



V postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo boste prejeli zdravila za spodbujanje jajčnikov. Prosimo vas, da natančno upoštevate navodila o jemanju zdravil in navodila za ultrazvočne preiskave. Vsa zdravila boste prejeli na Oddelku za OBMP Kliničnega oddelka za reprodukcijo, kjer vas bomo naučili, kako se jih pripravlja in uporablja, pomagajte pa si lahko tudi z naslednjo povezavo: <http://reprodukcija.si/zunajtelesna-oploditev/navodila/>.


Potek spodbujanja ovulacije:

1. Dajanje zdravil je prilagojeno vašemu menstrualnemu ciklusu, pri čemer se šteje **prvi dan menstruacije kot prvi dan ciklusa**.
2. Od 22. dneva ciklusa naprej boste prejeli dnevno Gonapeptyl (G) v obliki podkožnih injekcij.
3. Petnajsti dan uporabe Gonapeptyla vam bomo opravili ultrazvočno preiskavo maternice in jajčnikov v Ultrazvočni ambulanti Kliničnega oddelka za reprodukcijo. V primeru, da je 15. dan ciklusa sobota ali nedelja se jemanje Gonapeptyla podaljša do ponedeljka, ko boste opravili ultrazvočno kontrolo.
4. Če bodo izvidi preiskav ustrezali kriterijem, boste nadaljevali z uporabo Gonapeptyla do tedaj, ko boste prejeli stop injekcijo ("stop injekcija" - glej točko 7).
5. Hkrati s Gonapeptylom boste od 15. dneva (v primeru vikenda od ponedeljka naprej (torej od 16. ali 17. dne)) uporabe Gonapeptyla pričeli dobivati injekcije hormonov gonadotropinov (G) (Menopur, Puregon, Bemfola, Gonal F) za spodbujanje jajčnikov v odmerkih, ki vam jih bo predpisal zdravnik za zdravljenje neplodnosti ali zdravnik, ki izvaja ultrazvočno preiskavo.
6. Dvanajsti dan spodbujanja s hormoni gonadotropini vam bomo opravili UZ kontrolo in se odločali o nadaljnjem zdravljenju in ultrazvočnih kontrolah glede na UZ kriterije rasti foliklov.
7. Ko bodo doseženi UZ kriteriji rasti foliklov, boste prejeli injekcijo, ki izzove dokončno dozorevanje jajčnih celic - "stop injekcija" (X) (Ovitrelle) ob uri, ki jo določi zdravnik na ultrazvočni preiskavi.
8. Drugi dan po "stop injekciji" bomo opravili punkcijo jajčnikov, s katero bomo pridobili jajčne celice. Na dan punkcije mora biti prisoten za oddajo semena tudi vaš partner, da bomo lahko oplodili jajčne celice. Oba s partnerjem morata s seboj imeti identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica ali voziško dovoljenje ali potni list).
9. Če se bodo vaše celice pravilno oplodile, bomo drugi, tretji ali peti dan po punkciji jajčnikov opravili prenos največ dveh zarodkov v maternico, morebitne kakovostne nadštevne zarodke pa bomo zamrznili in shranili. Na dan prenosa zarodka mora biti prisoten z vami tudi vaš partner.
O eventualno zamrznjenih zarodkih boste obveščeni po pošti. S seboj morata imeti oba s partnerjem identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica ali voziško dovoljenje ali potni list).
10. Predpisali vam bomo vaginalne progesterone, ki jih boste jemali po navodilu zdravnika vaginalno z začetkom en dan po aspiraciji foliklov in jemanjem 14 dni ali do menstruacije.

11. Če 15 dni po prenosu zarodkov ne bo krvavitve, boste na delovni dan opravili test za ugotovitev nosečnosti na Oddelku za OBMP. Datum za opravljanje testa dobite ob prenosu zarodkov pri medicinskih sestrah na Oddelku za OBMP.

SHEMATSKI PRIKAZ PROTOKOLA

DAN MC	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
postopki															U Z *											U Z



Več informacij na www.reprodukcija.si