

NAVODILO PACIENTKI

»MILD« ali BLAGI PROTOKOL




V postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo boste prejeli zdravila za spodbujanje jajčnikov. Prosimo vas, da natančno upoštevate navodila o jemanju zdravil in navodila za ultrazvočne preiskave. Vsa zdravila boste prejeli na Oddelku za oploditev z biomedicinsko pomočjo Kliničnega oddelka za reprodukcijo, kjer vas bomo naučili, kako se jih pripravlja in uporablja.

Potek spodbujanja ovulacije:

1. Dajanje zdravil je prilagojeno vašemu menstrualnemu ciklusu, pri čemer se šteje **prvi dan menstruacije kot prvi dan ciklusa**.
2. Od 5. dneva menstrualnega ciklusa naprej boste prejeli injekcije hormonov gonadotropinov (G) (Menopur, Bemfol ali Gonal F) v odmerkih, ki vam jih je predpisal ginekolog specialist. Odmerek ostane enak ves čas stimulacije.
3. Sedmi dan menstrualnega ciklusa vam bomo v Ultrazvočni ambulanti Kliničnega oddelka za reprodukcijo napravili UZ kontrolo rodil in se odločili o nadaljnjem zdravljenju (in morebitnem dodajanju antagonista GnRH (Cetrotide, Orgalutran)) ter nadaljnjih ultrazvočnih kontrolah glede na UZ kriterije rasti foliklov.
4. Ko bodo doseženi UZ kriteriji rasti foliklov, boste prejeli injekcijo, ki izzove dokončno dozorevanje jajčnih celic - "stop injekcija" (Pregnyl, Primogonyl, Ovitrelle, Suprefact).
5. Drugi dan po "stop injekciji" bomo opravili punkcijo jajčnikov, s katero bomo pridobili jajčne celice. Na dan punkcije mora biti prisoten za oddajo semena tudi vaš partner, da bomo lahko oplodili jajčne celice. S seboj morata oba s partnerjem imeti identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica ali voziško dovoljenje ali potni list).
6. Če se bodo vaše celice pravilno oplodile, bomo drugi, tretji ali peti dan po punkciji jajčnikov opravili prenos največ dveh zarodkov v maternico, morebitne kvalitetne nadštevilne zarodke pa bomo zamrznili in shranili. Na dan prenosa zarodka mora biti prisoten z vami tudi vaš partner. O eventualno zamrznjenih zarodkih boste obveščeni po pošti. S seboj morata oba s partnerjem imeti identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica ali voziško dovoljenje ali potni list).
7. Predpisali vam bomo progesteronske vaginalete, ki jih boste jemali vaginalno, po navodilih zdravnika, z začetkom en dan po aspiraciji foliklov. Jemali jih boste 14 dni ali do menstruacije.
8. Če 15 dni po prenosu zarodkov ne bo krvavitve, boste opravili v delovnem dnevu test za ugotovitev nosečnosti na Oddelku za oploditev z biomedicinsko pomočjo. Datum za opravljanje testa dobite ob prenosu zarodkov pri medicinskih sestrah na Oddelku za oploditev z biomedicinsko pomočjo.

SHEMATIČNI PRIKAZ »MILD« PROTOKOLA

DAN MENST. CIKLUSA	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZDRAVILA					G	G	G A*
POSTOPKI							UZ



Več informacij na www.reprodukcija.si