



6252

OBVEŠČENI PRISTANEK NA POSTOPEK OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO

S postopkom me je podrobno seznanil _____.

Za potrebe postopka zunajtelesne oploditve so v večini primerov potrebna zdravila za spodbujanje rasti jajčnih foliklov. Zdravljenje s temi zdravili poveča tudi možnost za zanositev z dvojčki. Kot pri vseh zdravilih so tudi tu možni stranski učinki, kot sta slabost in bruhanje. Lahko se pojavi alergična reakcija na mestu vboda s srbenjem in rdečino, bolečina v sklepih, povišana telesna temperatura in glavobol. O tem nas prosimo obvestite.

Uporaba teh zdravil lahko povzroči tudi nevarno čezmerno spodbujanje jajčnikov, ki se kaže z napihnjenostjo, bolečinami v trebuhu, slabostjo, bruhanjem, slabšim odvajanjem vode in težkim dihanjem. V tem primeru se morate vrniti v bolnišnico in nas na to opozoriti, saj je zaplet lahko tudi smrtno nevaren.

Jajčne celice pridobimo s postopkom, ki se izvaja v operacijski sobi. Najprej na oddelku dobite tablete proti bolečinam in za pomiritev. Po aplikaciji lokalnega anestetika v steno nožnice se pod kontrolo vaginalnega ultrazvoka iz jajčnikov posrka tekočina jajčnih foliklov in z njo jajčne celice. Če želite oziroma če imate veliko foliklov, je možno postopek izvesti v intravenozni analgo-sedaciji ali v splošni anesteziji. Da bi bil postopek čim manj boleč morate biti sproščeni, zato se z zdravnikom, ki poseg izvaja, o vsem pogovorite z zdravnikom. Ker je pridobivanje jajčnih celic invaziven poseg, so ob tem možne tudi komplikacije. Najpogostejša je rahla krvavitev iz nožnice, ki sama preneha, ter rahla bolečina v trebuhu po posegu. Ker je pri posegu možna tudi poškodba jajčnika ali žilja v trebušni votlini, lahko izjemoma pride do krvavitve v trebušno votlino ter močnejših bolečin. Redko pride do vnetja v trebušni votlini. Če se pred odhodom domov ne počutite dobro, nas na to opozorite.

Če se stanje slabša doma, se je potrebno čim prej vrniti v bolnišnico, kjer vas bomo opazovali ali izjemoma tudi operirali. V dopoldanskem času se vrnite na Klinični oddelek za reprodukcijo, Šlajmerjeva 3; popoldne in med vikendom pa se zglaste v Urgentni ginekološki ambulantni UKC Ljubljana oziroma v najbližji urgentni ginekološki ambulantni.

Prenos zarodka v maternico je praviloma neboleč poseg, podoben običajnemu ginekološkemu pregledu. S pomočjo plastičnega katetra se en ali največ dva zarodka preneseta v maternico. Po prenosu je možna rahla krvavitev iz materničnega vratu, ki pa za nosečnost ni nevarna. V kolikor bi se razvilo več kvalitetnih zarodkov, se le-ti shranijo z zamrzovanjem in se hranijo 5 let.

Seznanjena sva z dejstvom, da je postopek zunajtelesne oploditve omejeno uspešen in da Klinični oddelek za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana ne prevzema nikakršne odgovornosti glede poteka morebitne nosečnosti in zdravja otroka. Seznanjena sva, da se postopek v celoti izvaja na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, vključno s prenosom morebitnih zamrznjenih zarodkov.

Spodaj podpisana izjavljava, da sva prebrano razumela in sva seznanjena z morebitnimi zapleti postopka zunajtelesne oploditve in prenosa zarodka v maternico.

V Ljubljani, _____

Podpis pacientke: _____

Podpis partnerja: _____