



NAVODILA ZA JEMANJE ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE ENDOMETRIOZE IN MIOMOV - RYEQO

Spoštovani,

Hormonsko zdravljenje endometrioze s predvidenimi zdravili zavira delovanje jajčnikov (zavira ovulacijo) in blaži simptome povezane z endometriozo (boleče menstruacije, dolgotrajna bolečina v mali medenici, bolečine pri spolnih odnosih).

Hormonska terapija v času **do kirurškega zdravljenja** preprečuje napredovanje endometrioze in zmanjša bolečine v času do operativnega zdravljenja.

Hormonsko zdravljenje **po kirurškem zdravljenju** zniža verjetnost ponovitve bolezni in zmanjša težave zaradi endometrioze.

Za zdravljenje endometrioze smo vam predpisali zdravilo **RYEQO**, ki ga jemljite po naslednjih navodilih:

- Tablete začnete jemati prvi dan menstrualnega ciklusa. Če se zdravljenje začne kateri koli drug dan menstruacijskega ciklusa, se lahko na začetku pojavi neredna in/ali močna krvavitev.
- Jemljete eno tableto na dan, vsak dan ob približno istem času, s kozarcem vode, s hrano ali brez nje. Tablete jemljete neprekinjeno, vsak dan, brez premorov.
- V primeru izpuščene tablete je potrebno pozabljeno tableto vzeti čim prej in nadaljevati naslednji dan z jemanjem tablete ob običajnem času.
- Po najmanj enem mesecu uporabe zdravilo Ryeqo zavira ovulacijo pri ženskah, ki jemljejo priporočeni odmerki, in zagotavlja kontracepcijo. V prvem mesecu jemanja je potrebno uporabljati pregradne metode kontracepcije.
- Večina žensk (70 %) ob jemanju Ryeqo terapije nima menstruacij. S tem preprečujemo napredovanje endometrioze in miomov.

Kolektiv KO za reprodukcijo