

NAVODILA ZA JEMANJE ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE ENDOMETRIOZE - SIBILLA

Spoštovani,

Hormonsko zdravljenje endometrioze s predvidenimi zdravili zavira delovanje jajčnikov (zavira ovulacijo) in blaži simptome povezane z endometriozo (boleče menstruacije, dolgotrajna bolečina v mali medenici, bolečine pri spolnih odnosih).

Hormonska terapija v času **do kirurškega zdravljenja** preprečuje napredovanje endometrioze in zmanjša bolečine v času do operativnega zdravljenja.

Hormonsko zdravljenje **po kirurškem zdravljenju** zniža verjetnost ponovitve bolezni in zmanjša težave zaradi endometrioze.

Za zdravljenje endometrioze smo vam predpisali zdravilo **SIBILLA**, ki ga jemljite po naslednjih navodilih:

- Tablete začnete jemati prvi dan menstruacije.
- Jemljite po eno tableto na dan. Jemljite samo bele, aktivne tablete, teh je v zavoju 21. Neaktivne zelene tablete, teh je v zavoju 7, vsakič zavrzite.
- Jemljite po tri zavoje samo aktivnih – belih tablet zaporedoma, skupaj 63 tablet, neprekinjeno.
- Nato naredite 7 dni premora, v katerem tablet ne jemljete in v katerem se pojavi menstruaciji podobna krvavitev. Osmi dan začnete jemati tablete iz novega zavoja.
- V primeru, da se pri drugem ali tretjem zavoju pojavi krvavitev iz nožnice, ki v nekaj dneh ne izgine, naredite premor za 4 dni, ko tablet ne jemljete. Peti dan ponovno začnete z jemanjem tablet, jemljite tri zavoje aktivnih tablet neprekinjeno.
- Zdravilo Sibilla deluje tudi kot kontracepcijska metoda in ob rednem jemanju zanesljivo ščiti pred neželeno nosečnostjo.

Kolektiv KO za reprodukcijo